



ىلإكليلد® EVKKEEZA (نقحلل باموكاني فيا)

لورتلسلوك طرف جالع ىلع فرعتلا جاودزالا لثامتم ىلئاعلا مدلا (HoFH)

قوف امف تاونس 5 رمعب لافطأل اوارابكلا جالع ل EVKKEEZA ءاود مدختسي طرف ىمسي ضرمنع مجانللا مدلا ىف لورتلسلوكلا عافترانم نوناعي نىذلا مع EVKKEEZA ءاود مدختسي (HoFH). جاودزالا لثامتم ىلئاعلا مدلا لورتلسلوك ىف لورتلسلوكلا اىوتسم ضفخل ىرخأ ءىودأوم سدلا لىلق ىئاذغ ماظن مدلا.

طرف ل جالعك EVKKEEZA ءاود نع تامولعمب كديوزت ىلإ بىتكلا اذف فدهى دىزمل ىلع فرعتت فوس (HoFH). جاودزالا لثامتم ىلئاعلا مدلا لورتلسلوك ىف بىناجالا راتالالوح تاداشراو همادختسا ءىف ىكفو، EVKKEEZA ءاود ءىل اعنع

حقائق سريعة

- ① دواء EVKEEZA: يستخدم لعلاج المستويات العالية للغاية من الكوليسترول الضار (HoFH). الذي يظهر في فرط كوليسترول الدم العائلي متمائل الازدواج
- ② يقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الدم
- ③ هو عبارة عن حقنة تُضخ في الوريد لمدة 60 دقيقة، تُعطى كل 4 أسابيع

ما هو فرط كوليسترول الدم العائلي متمائل الازدواج (HoFH)؟


الأشخاص المصابون بفرط كوليسترول الدم العائلي لديهم مستويات عالية (HoFH) متمائل الازدواج للغاية من الكوليسترول الضار منذ الولادة.



يمكن أن تؤدي مستويات الكوليسترول المرتفعة إلى نوبات سخونة أو مرض صمام القلب أو مشاكل أخرى في سن مبكرة.



ينتشر فرط كوليسترول الدم العائلي متمائل الازدواج في العائلات وعادة ما ينتقل من الأب والأم (HoFH).



وكيف EVKEEZA ما هو دواء يعمل؟

مع نظام غذائي قليل الدسم وأدوية أخرى لخفض مستويات EVKEEZA يستخدم دواء الكولسترول لدى الكبار والأطفال بعمر 5 سنوات فما فوق الذين يعانون من ارتفاع الكولسترول في الدم الناجم عن فرط كوليسترول الدم العائلي متماثل الازدواج (HoFH).

هو مرض خطير ينتقل وراثيًا من (HoFH) فرط كوليسترول الدم العائلي متماثل الازدواج والوالدين. وهذا المرض يعرقل بصفة حادة قدرة الجسم على التخلص من مما يسبب ارتفاعًا شديدًا في مستويات (LDL-C) الكوليسترول الضار في الدم الكوليسترول الضار الذي يبقى في الجسم.

هنالك بروتينين يسمّى، (HoFH) في حالة فرط كوليسترول الدم العائلي متماثل الازدواج البروتين (يمنع الجسم من إزالة (ANGPTL3) بالبروتين الشبيه بالأنجيوبوتين لمنع تأثير هذه البروتين الشبيه EVKEEZA الكوليسترول الضار. تم تطوير دواء بالأنجيوبوتين 3

ترتبط بالبروتين الشبيه بالأنجيوبوتين، EVKEEZA إيفيناكوماب، المادة الفاعلة في دواء 3 وتمنع تأثيراته. عندما يمنع إيفيناكوماب تأثيرات البروتين الشبيه بالأنجيوبوتين 3، ينخفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، وقد يؤدي هذا أيضًا إلى الحد من الأضرار الناتجة عن ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار.

هذه هي الطريقة التي يمكن أن يخفض بها
مستويات الكوليسترول الضار EVKEEZA دواء.



كيف يتم حقن دواء EVKKEEZA؟

ملغ/كغ 15

الذي سيعطيه لك، تعتمد EVKKEEZA سيحدد طبيبك مقدار دواء الكمية على وزنك، الجرعة الموصى بها هي 15 ملغ لكل 1 كغ من وزنك.



15
غك/غم

دقيقة/4 أسابيع 60

سوف يقوم طبيبك او ممرضتك بحقنك دواء

قطرة بقطرة في الوريد) عبر أنبوب وريدي (المدة 60 دقيقة. EVKKEEZA كل 4 أسابيع EVKKEEZA سيتم إعطاؤك دواء

في حالة وجود آثار جانبية معينة، سيقوم أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك بإبطاء معدل الحقن، أو إيقافه مؤقتًا، أو إيقاف العلاج بشكل دائم EVKKEEZA بدواء

60
دقيقتان

EVKKEEZA يمكن إضافة دواء إلى العلاجات المتوفرة حاليًا لخفض مستويات الكوليسترول الضار، لذلك قد يصف لك طبيبك أدوية أخرى. تأكد من استخدامها تمامًا كما يخبرك طبيبك أو ممرضتك.



4 لك
عرباساً

ماذا لو فاتتك جرعة؟

إذا فاتتك أي مواعيد للحقن، فاتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك في أقرب وقت ممكن لإعادة جدولة الجرعة.



ما تحتاج إلى معرفته عن الحقن الوريدي؟

1 التحضير للحقن

- تحدث مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك عن المكان الذي سيتم فيه الحقن.
- تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك حول أهمية شرب الماء خاصة إذا كان لديك أي قيود طبية تحدث من تناول السوائل.
- يمكن أن يسهل شرب الماء (الإماهة) العثور على الأوردة التي يصعب الوصول إليها.
- ارتد ملابس مريحة تسمح بالوصول إلى ذراعك (قد تختلف درجة حرارة الغرفة).
- أحضر معك كتابًا، أو جهازًا لسماع الموسيقى أو جهاز حاسوب لوحي (تابلت) للترفيه.
- قد يرغب مقدم الرعاية في الاستعداد بطريقة معينة لإلهاء الطفل أثناء العلاج.

2 قبل الحقن

- قد يطرح عليك أخصائي الرعاية الصحية أسئلة حول صحتك العامة.
- قد تتلقى تقييمًا صحيًا بسيطًا.

3 أثناء الحقن

- من خلال إبرة توضع في الوريد في ذراعك EVKKEEZA سيتم إعطاءك دواء.
- يستمر التنقيط في الوريد حوالي 60 دقيقة.
- سيقوم أخصائي الرعاية الصحية بمتابعتك.
- في حال ظهور أعراض جانبية، يجب عليك أن تخبر أخصائي الرعاية الصحية على الفور.

4 بعد الحقن

- ستتم متابعتك بحثًا عن الآثار الجانبية بعد حقن دواء EVKKEEZA.
- اتبع تعليمات فريق الرعاية الصحية الخاص بك بعد الحقن.
- حدّد موعدًا لزيارة متابعة مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.
- في حال ظهور أعراض جانبية أو تفاعلات غير عادية، اتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

آثارًا جانبية، على الرغم من أنها لا تصيب EVKKEEZA يمكن أن يسبب دواء الجميع. تحدث إلى طبيبك أو ممرضتك إذا واجهت أي أعراض جانبية أثناء أو بعد الحقن.

الآثار الجانبية المحتملة

- ألم في البطن
- ألم في الظهر
- إمساك
- انخفاض الطاقة
- دوخة
- أعراض الأنفلونزا
- حكة في مكان الحقن
- غثيان
- ألم في الساقين أو الذراعين
- سيلان الأنف
- إرهاق (للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 115 عامًا)
- التهاب الحلق أو التهاب الجيوب الأنفية

آثار جانبية غير شائعة ولكنها خطيرة

الحساسية المفرطة (قد تشمل الأعراض: تورم الشفتين أو اللسان أو الحلق، مما يسبب صعوبة في البلع أو التنفس، وقد تشمل أيضًا الصقيع أو الشعور بالدوار أو الإغماء)

إذا ظهرت عليك هذه الأعراض، فتوقف عن أخذ الدواء واحصل على مساعدة طبية فورية.

هذه ليست قائمة كاملة بالآثار الجانبية التي قد تظهر عليك عند تناول دواء. إذا كانت لديك أعراض مزعجة أو آثار جانبية غير مدرجة هنا أو EVKKEEZA أصبحت سيئة بما يكفي للتدخل في أنشطتك اليومية، فعليك أن تخبر أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك.

لا تستخدم دواء EVKKEEZA إذا:

▪ كانت لديك حساسية من إيفيناكوماب أو أي من المكونات الأخرى في هذا العقار

**للمساعدة في تجنب الآثار الجانبية وضمان الاستخدام السليم، تحدث إلى أخصائي الرعاية
تحدث عن أي حالات صحية أو مشاكل قد. EVKKEEZA الصحية الخاص بك قبل أخذ دواء
تكون لديك، بما في ذلك**

▪ إذا كنتِ حامل، أو تعتقدين أنك قد تكونين حامل، أو تخططين للحمل، فاطلبي
قد يؤدي دواء EVKKEEZA. المشورة من أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك قبل أخذ دواء
طفلك الذي لم يولد بعد. أخبري أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك إذا أصبحت EVKKEEZA
للقادرات على الحمل. EVKKEEZA حامل أثناء استخدام دواء

▪ قد يقوم أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك بإجراء اختبار الحمل قبل البدء في
EVKKEEZA. العلاج بدواء

▪ يجب عليك استخدام طريقة فعالة لمنع الحمل أثناء العلاج ولمدة 5 أشهر على
تحدثي إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك حول EVKKEEZA. الأقل بعد آخر جرعة من دواء
طرق منع الحمل التي يمكنك استخدامها خلال هذا الوقت.

▪ إذا كنتِ ترضعين طفلك رضاعة طبيعية أو تخططين للرضاعة الطبيعية، فاطلبي
من غير المعروف ما إذا EVKKEEZA. المشورة من أخصائي الرعاية الصحية قبل إعطائك دواء
ينتقل إلى حليب الثدي. يجب أن تقرري أنت وأخصائي الرعاية الصحية EVKKEEZA كان دواء
أو سترضعين طفلك رضاعة طبيعية EVKKEEZA الخاص بك ما إذا كنتِ ستتلقين دواء

**أخبر أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك عن جميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك أي أدوية
أو فيتامينات أو معادن أو مكملات طبيعية أو أدوية بديلة**

▪ مع عقاقير أخرى EVKKEEZA لم يتم إجراء دراسات لاختبار كيفية تفاعل دواء

إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء، اسأل طبيبك أو ممرضتك.

أين يمكنني الوصول إلى المزيد من
الموارد؟

The Canadian FH Registry

<https://www.fhcanada.net/>



EVKEEZA Website

<https://www.evkeeza.ca/>



ابحث عن دراسة المنتج الكاملة التي تم إعدادها لمتخصصي الرعاية الصحية
وتتضمن معلومات عن أدوية المريض عن طريق زيارة موقع وزارة الصحة الكندية
أو موقع الشركة المصنعة (<https://www.canada.ca/en/health-canada.html>)
أو عن طريق الاتصال (<https://www.ultragenyx.com/canadian-english>)
بالرقم 5872-388-833-1

هي علامة تجارية مسجلة لشركة
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

© 2024 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. and Ultragenyx
Pharmaceutical, Inc. All rights reserved.

MRCP-UX858-00292 02/2024

