



Pr **Evkeeza**[®]
evinacumab for injection

معلومات المريض

ما هي استخدامات دواء EVKKEEZA[®] ؟

إفيناكوماب للحقن (لعلاج الكبار EVKKEEZA) يستخدم دواء والأطفال بعمر 5 سنوات فما فوق ممن يعانون من ارتفاع الكولسترول في الدم الناجم عن حالة تسمى فرط كولسترول الدم مع EVKKEEZA يستخدم دواء (HoFH). العائلي متمثل الازدواج نظام غذائي قليل الدسم وأدوية أخرى لخفض مستويات الكولسترول في الدم.

استخدم هذا EVKKEEZA. اقرأ نشرة معلومات دواء المريض لمزيد من المعلومات حول دواء الكتيب كأداة للمناقشة مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك. لا يُعد هذا الكتيب بديل عن التحدث مع أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك حول حالتك أو علاجك.



يُستخدم EVKEEZA
مع نظام غذائي قليل الدسم وأدوية أخرى
لخفض مستويات الكوليسترول

ما هو فرط كوليسترول الدم العائلي متماثل الازدواج (HoFH)؟

ينتشر فرط كوليسترول الدم العائلي متماثل الازدواج في العائلات وعادةً ما ينتقل عن طريق الأب (HoFH) والأم. يعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من منذ (LDL) مستويات عالية للغاية من الكوليسترول الضار الولاية.

كيف يعمل دواء EVKKEEZA؟

بيروتين في، EVKKEEZA يرتبط إيفيناكوماب، المادة الفعالة في دواء الجسم يسمى البروتين الشبيهه بالأنجيوبوتين 3 ويمنع آثاره. يشارك البروتين الشبيهه بالأنجيوبوتين 3 في التحكم في مستويات الكوليسترول. عندما يمنع إيفيناكوماب آثار البروتين الشبيهه بالأنجيوبوتين 3، ينخفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم ويمكن أيضاً تقليل المشاكل الناجمة عن ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار.

ما هي الآثار الجانبية المحتملة لاستخدام دواء EVKEEZA؟

إذا واجهت أي EVKEEZA. هذه ليست جميع الآثار الجانبية المحتملة التي قد تكون لديك عند أخذ دواء آثار جانبية غير مدرجة هنا، فعليك إخبار أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك

- ألم في البطن
- ألم في الظهر
- إمساك
- انخفاض الطاقة
- دوخة
- أعراض الأنفلونزا
- حكة في مكان الحقن
- غثيان
- ألم في الساقين أو الذراعين
- سيلان الأنف
- (إرهاق) للمرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 5-11 عامًا
- التهاب الحلق أو التهاب الجيوب الأنفية

من الآثار الجانبية غير الشائعة ولكنها خطيرة:

الحساسية المفرطة) قد تشمل هذه الأعراض تورم الشفتين أو اللسان أو الحلق مما يجعل من الصعب البلع أو التنفس، وقد تشمل أيضًا الصفير عند التنفس أو الشعور بالدوار أو الإغماء. إذا كنت تعاني من الحساسية المفرطة، توقف عن أخذ الدواء واحصل على مساعدة طبية فورية

إذا كانت لديك أعراض مزعجة أو آثار جانبية غير مدرجة هنا أو أصبحت سيئة لدرجة التدخل في أنشطتك اليومية، فأخبر أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك

الجرعة المفرطة

من غير المرجح أن تتلقى كمية كبيرة حيث ستتم EVKEEZA جدًا من دواء مراقبتك عن كثب من قبل متخصصي الرعاية الصحية أثناء عملية الحقن. ومع ذلك، إذا كنت تعتقد أنك أو أي شخص تقوم برعايته، قد أخذت كمية كبيرة جدًا فاتصل بأخصائي، EVKEEZA من دواء الرعاية الصحية أو قسم الطوارئ في المستشفى أو المركز الإقليمي لمكافحة السموم على الفور، حتى لو لم تكن هناك أعراض

معلومات هامة للسلامة

لا تستخدم دواء EVKEEZA إذا:

- كانت لديك حساسية من إيفيناكوماب أو أي من مكونات هذا الدواء
- المكون الطبي: إيفيناكوماب
- المكونات غير الطبية: إل-أرجينين هيدروكلوريد، إل-هيسيتيدين؟ مونوهيدروكلويد؟، إل- USP، هيسيتيدين مونوهيدروكلوريد مونوهيدرات، إل-برولين، بوليسوربات 80، وماء للحقن

للمساعدة في تجنب الآثار الجانبية وضمان الاستخدام السليم، تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية
تحدث عن أي حالات صحية أو مشاكل قد تكون لديك، بما EVKEEZA. الخاص بك قبل أخذ دواء
في ذلك

- إذا كنتِ حاملًا، أو تعتقدين أنك قد تكونين حاملًا، أو تخططين للحمل، فاطلبي المشورة من
طفلك الذي EVKEEZA قد يؤدي دواء. EVKEEZA أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك قبل أخذ دواء
لم يولد بعد. أخبري أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك إذا أصبحتِ حاملًا أثناء استخدام دواء
EVKEEZA.

للقدرات على الحمل:

- قد يقوم أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك بإجراء اختبار الحمل قبل البدء في العلاج باستخدام دواء
EVKEEZA.
- يجب عليك استخدام طريقة فعالة لمنع الحمل أثناء العلاج ولمدة 5 أشهر على الأقل بعد آخر جرعة
تحدثي إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك حول طرق منع الحمل التي EVKEEZA من دواء
يمكنك استخدامها خلال هذا الوقت
- إذا كنتِ ترضعين طفلك رضاعة طبيعية أو تخططين للرضاعة الطبيعية، فاطلبي المشورة من أخصائي
ينتقل إلى EVKEEZA من غير المعروف ما إذا كان دواء EVKEEZA. الرعاية الصحية قبل إعطائك دواء
حليب الثدي. يجب أن تقرري أنتِ وأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك ما إذا كنتِ ستتلقين دواء
أو سترضعين طفلك رضاعة طبيعية EVKEEZA
- أخبر أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك عن جميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك أي أدوية أو
فيتامينات أو معادن أو مكملات طبيعية أو أدوية بديلة

- مع عقاقير أخرى EVKEEZA لم يتم إجراء دراسات لاختبار كيفية تفاعل دواء

ماهي الجرعة المعتادة؟

لمدة (IV) هي 15 ملغم /كغم يتم إعطاؤها عن طريق الحقن في الوريد EVKKEEZA الجرعة المعتادة لدواء 60 دقيقة كل 4 أسابيع

كيف يمكنني أخذ دواء EVKKEEZA؟

في الوريد من خلال أنبوب وريدي EVKKEEZA سيعطيك أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك حقنة دواء لمدة 60 دقيقة (IV)

كل 4 أسابيع. إذا فاتتك أي مواعيد للحقن، فاتصل بأخصائي الرعاية الصحية EVKKEEZA ينبغي إعطاء دواء الخاص بك في أقرب وقت ممكن لإعادة جدولة الجرعة

قد يبطئ أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك معدل الحقن أو يوقف الحقن مؤقتاً أو يوقف العلاج بدواء بشكل دائم إذا كانت لديك آثار جانبية معينة EVKKEEZA

. قد يصف أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك أدوية أخرى لخفض الكوليسترول لاستخدامها مع دواء. استخدم الأدوية الموصوفة الأخرى تماماً كما يخبرك أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك EVKKEEZA

ماذا يحدث إذا نسيت جرعة؟

اتصل بأخصائي الرعاية الصحية الخاص بك في أقرب وقت، EVKKEEZA إذا فاتتك جرعة من دواء. ممكن لتحديد موعد آخر

دعم المرضى

لدينا هم أشخاص محترفون ذوو خبرة وعلى استعداد لدعمك في كل UltraCare® مديرو الحالات في خطوة. ويمكنهم مساعدتك فيما يلي:

تحديد أهليتك للحصول على
الدعم المالي



التعرف على المزيد حول العلاج
بدواء EVKKEEZA



فهم التغطية التأمينية
الخاصة بك



لمعرفة المزيد عن خدمات المرضى لدينا:
اتصل بالرقم **(ULTRA)1-833-388-5872**
فاكس **(CARE)1-833-592-2273**

UltraCare®





 **Evkeeza**[®]
evinacumab for injection

لعلاج الكبار والأطفال بعمر 5 سنوات وما فوق EVKEEZA يستخدم دواء الذين يعانون من ارتفاع الكولسترول في الدم الناجم عن حالة تسمى فرط يستخدم دواء (HoFH). كولسترول الدم العائلي متمثل الازدواج مع نظام غذائي قليل الدسم وأدوية أخرى لخفض مستويات EVKEEZA الكولسترول في الدم.

إذا كنت تريد المزيد من المعلومات حول دواء EVKEEZA:

تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك

اطلع على دراسة المنتج الكاملة التي تم إعدادها لمتخصصي الرعاية الصحية، والتي تتضمن معلومات الدواء للمريض. (يمكنك أيضًا العثور على دراسة المنتج من خلال زيارة موقع وزارة الصحة الكندية أو عن طريق) <https://www.canada.ca/en/healthcanada.html> (أو موقع الشركة المصنعة) <https://www.ultragenyx.com/canadian-english> الاتصال بالرقم 1-833-388-5872



© 2024 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. and Ultragenyx
Pharmaceutical, Inc. All rights reserved.

MRCP-UX858-00291 02/2024