



Votre guide d'EVKEEZA (évinacumab pour injection)

Pour bien comprendre votre traitement de la HFHo

EVKEEZA est utilisé avec un régime alimentaire faible en matières grasses et d'autres médicaments afin d'abaisser les taux de cholestérol des adultes et des enfants âgés de 6 mois et plus qui présentent des taux de cholestérol très élevés causés par la HFHo.

La présente brochure vise à vous informer sur EVKEEZA dans le cadre d'un traitement contre l'hypercholestérolémie familiale homozygote (HFHo). Vous y apprendrez la manière dont EVKEEZA est administré et agit, et quoi faire si vous ressentez des effets secondaires.

Veuillez lire le dépliant d'information sur le médicament destiné aux patients pour de plus amples renseignements sur EVKEEZA.

Cette brochure est un résumé, qui ne couvre pas tout ce qui a trait au médicament. Discutez de votre état de santé et votre traitement avec votre professionnel de la santé pour savoir s'il existe de nouveaux renseignements au sujet d'EVKEEZA.

ultragenyx

En bref

- EVKEEZA:**
- ① Est utilisé pour traiter les taux de cholestérol-LDL extrêmement élevés associés à la HFHo
 - ② Peut faire baisser les taux de cholestérol
 - ③ Est administré par perfusion intraveineuse de 60 min, toutes les 4 semaines


Qu'est-ce que la HFHo?



Les personnes atteintes de HFHo présentent des taux de C-LDL (« mauvais cholestérol ») extrêmement élevés depuis la naissance.



Des taux de cholestérol aussi élevés peuvent entraîner des crises cardiaques, des maladies des valves cardiaques ou d'autres problèmes à un âge précoce.



La HFHo est héréditaire, généralement transmise à la fois par le père et par la mère.

Qu'est-ce qu'EVKEEZA et comment ce médicament agit-il?

EVKEEZA est utilisé avec un régime alimentaire faible en matières grasses et d'autres médicaments afin d'abaisser les taux de cholestérol des adultes et des enfants âgés de 6 mois et plus qui présentent des taux de cholestérol très élevés causés par la HoFH.

La HFHo est une maladie grave héritée des parents qui restreint lourdement la capacité du corps à éliminer le mauvais cholestérol (C-LDL) et fait en sorte que des taux extrêmement élevés de mauvais cholestérol persistent dans le corps.

En présence de HFHo, ANGPTL3 (une protéine) empêche le corps d'éliminer le mauvais cholestérol. EVKEEZA a été conçu pour bloquer les effets d'ANGPTL3.

L'évinacumab, substance active d'EVKEEZA, se fixe à ANGPTL3 et inhibe ses effets. Lorsque l'évinacumab bloque les effets d'ANGPTL3, le taux de cholestérol-LDL sanguin baisse et les problèmes causés par les taux élevés de cholestérol-LDL peuvent également diminuer.



C'est ainsi qu'EVKEEZA peut réduire les taux cholestérol.

Comment prendre EVKEEZA?



15
mg/kg

15 mg/kg

Votre médecin déterminera la quantité d'EVKEEZA à vous administrer. Cette quantité dépendra de votre poids. La dose recommandée est de 15 milligrammes par kilogramme de poids corporel.

60
minutes

60 minutes/4 semaines

EVKEEZA est administré par votre médecin ou infirmière en goutte-à-goutte dans une veine (perfusion intraveineuse) pendant 60 minutes, et ce, toutes les 4 semaines.

Votre professionnel de la santé peut ralentir, interrompre ou arrêter le débit de la perfusion d'EVKEEZA si vous ressentez certains effets secondaires.



EVKEEZA peut être pris en complément des traitements hypocholestérolémiants actuels, par conséquent votre médecin peut vous prescrire d'autres médicaments. Veuillez à les utiliser comme indiqué par votre médecin ou votre infirmière.

Toutes les
4 semaines



Dose oubliée?

Si vous avez manqué un rendez-vous où vous deviez recevoir EVKEEZA, parlez-en à votre professionnel de la santé le plus tôt possible pour planifier un nouveau rendez-vous.

Que dois-je savoir sur ma perfusion?

1 Préparation à la perfusion

- Discutez avec votre professionnel de la santé de l'endroit où vous recevrez votre perfusion
- Discutez avec lui ou avec elle de l'importance de l'hydratation, surtout si vous avez des restrictions médicales qui limitent les liquides
- L'hydratation (boire de l'eau) peut aider à trouver les veines difficiles
- Choisissez des vêtements confortables permettant d'accéder facilement à votre bras (la température de la pièce peut varier)
- Prévoyez d'emporter un livre, de la musique ou une tablette pour vous distraire
- Si vous êtes soignante ou soignant, prévoyez éventuellement des moyens d'occuper votre enfant pendant le traitement

2 Avant la perfusion

- Votre professionnel de la santé peut vous poser des questions sur votre état général
- Il se peut qu'il ou elle évalue sommairement votre santé

3 Pendant la perfusion

- EVKEEZA sera administré dans une veine de votre bras à travers une aiguille
- La perfusion durera environ 1 h (60 min)
- Une ou un professionnel de la santé vous surveillera
- Alerte-la ou alertez-le immédiatement si vous ressentez des effets secondaires

4 Après la perfusion

- Vous resterez en observation au cas où des effets secondaires apparaîtraient après votre perfusion d'EVKEEZA
- Suivez les instructions de votre équipe de soins après la perfusion.
- Planifiez une visite de suivi auprès de votre professionnel de la santé
- Appelez votre professionnel de la santé si vous faites une réaction ou ressentez des symptômes inhabituels

Quels sont les effets secondaires possibles?

EVKEEZA peut causer des effets secondaires, qui ne sont toutefois pas systématiques. Parlez-en à votre médecin ou votre infirmière si vous ressentez des effets secondaires pendant ou après votre perfusion.

Effets secondaires possibles

- Douleurs abdominales
- Dorsalgie
- Constipation
- Diminution de l'énergie
- Sensation d'étourdissement
- Symptômes grippaux
- Démangeaisons au site de perfusion
- Nausée
- Douleur dans les jambes ou les bras
- Écoulement nasal
- Fatigue (chez les patients âgés de 5 à 11 ans)
- Mal de gorge ou sinusite

Effets secondaires rares, mais graves

Anaphylaxie (les symptômes peuvent inclure une tuméfaction principalement des lèvres, de la langue ou de la gorge compliquant la déglutition ou la respiration, une respiration sifflante, une sensation d'étourdissement ou un évanouissement).

Si vous ressentez ces symptômes, cessez de prendre le médicament et obtenez une aide médicale sans délai.

Voici certains des effets secondaires possibles que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez EVKEEZA. En cas de symptôme ou d'effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Ne prenez pas EVKEEZA si :

- Vous êtes allergique à l'évinacumab ou à l'un des autres composants contenus de ce médicament.

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre EVKEEZA, afin de réduire la possibilité d'effets secondaires et d'utiliser correctement le médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment :

- Si vous êtes enceinte, que vous pensez être enceinte ou que vous planifiez une grossesse, demandez conseil à votre professionnel de la santé avant de prendre EVKEEZA. EVKEEZA peut nuire à votre enfant à naître. Informez immédiatement votre professionnel de la santé si vous entamez une grossesse pendant votre traitement avec EVKEEZA.
- Si vous êtes fertile :**

- Votre professionnel de la santé peut vous faire passer un test de grossesse avant de commencer le traitement avec EVKEEZA.
- Vous devez utiliser une méthode contraceptive efficace pendant le traitement et pendant au moins les 5 mois qui suivent la dernière administration d'EVKEEZA. Discutez avec votre professionnel de la santé de la meilleure méthode de contraception pour vous pendant cette période.
- Si vous allaitez ou envisager d'allaiter, demandez conseil à votre professionnel de la santé avant de prendre d'EVKEEZA. On ne sait pas si EVKEEZA est excrété dans le lait maternel. Vous devrez décider avec votre professionnel de la santé si vous prendrez EVKEEZA ou que vous allaiterez.

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les médicaments que vous prenez, y compris les vitamines, minéraux, suppléments naturels ou médicaments alternatifs.

- Aucune étude visant à tester la façon dont EVKEEZA interagit avec d'autres médicaments n'a encore été menée.

Pour toute question concernant l'utilisation de ce médicament, adressez-vous à votre médecin ou votre infirmière.

Où puis-je trouver d'autres ressources?



Le Registre HF Canada

<https://www.fhcanada.net/fr/>



EVKEEZA

<https://www.evkeeza.ca/fr>

Obtenez la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements sur le médicament pour les patients, en visitant le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada.html>) ou le site Web du fabricant (<https://www.ultragenyx.com/canadian-french/>), ou encore en appelant au 1 833 388-5872.

EVKEEZA est une marque déposée de Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

© Regeneron Pharmaceuticals, Inc. et Ultragenyx Pharmaceutical, Inc., 2025. Tous droits réservés.

MRCP-UX858-00095 08/2025

